





























FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fase	Duración	Cantidad de personas*	Propósito		
 <p>Fase 1</p>	 1 mes	 10-20	 ¿Es seguro?	 ¿Cómo lo procesa el cuerpo?	 ¿Cuáles son los efectos secundarios?
 <p>Fase 2</p>	 3 - 12 meses	 50-75	 ¿Es seguro?	 ¿Está funcionando bien?	 ¿Cuánto hay que administrar?
 <p>Fase 3</p> <p><i>Si tiene éxito</i></p>	 6 - 12 meses	 100-300	 ¿Es seguro?	 ¿Está funcionando bien?	 ¿Es mayor el beneficio que el riesgo?
<div> <div>Aprobación de la FDA</div> <div>  <p>Se presenta la solicitud</p> </div> <div>→</div> <div>  <p>Se revisa la solicitud</p> </div> <div>→</div> <div>  <p>Se aprueba la solicitud</p> </div> <div>→</div> <div>  <p>Disponible para el público</p> </div> </div> <p>(6-12 meses)</p>					
 <p>Fase 4</p>	 3 - 12 meses	 100-300	 ¿Todavía parece ser seguro?	 ¿Hay efectos secundarios poco frecuentes?	 Costo-eficacia y comparación con otras medicinas similares

 = 15 participantes sanos
 = 15 participantes con FQ

 = Cantidad de meses de participación

*La cantidad de participantes varía según las características del estudio